



## Preparación para endoscopia superior (EGD)

904-388-8686

### Preparación

**La endoscopia superior** (también conocida como esófago-gastroduodenoscopia o EGD) consiste en un examen interno de su esófago, estomago y primera parte de su intestino delgado. Este examen se realiza con un endoscopio de fibra óptica, es cual es flexible e iluminado y visualiza directamente la parte interna de su tracto gastrointestinal.

Un día antes de su procedimiento, puede comer y beber de manera normal hasta la media noche. **Después**

**de la media noche no ingiera nada por la boca, a excepción de medicamentos o traguitos de agua.** Estas

instrucciones están diseñadas para maximizar la facilidad, seguridad y éxito de su preparación.

### Una semana antes del procedimiento:

- NO tome pastillas de hierro.
- Su doctor le indicara si necesita dejar de tomar ciertos medicamentos antes de su procedimiento. Estos medicamentos pueden incluir: coumadin, aspirina, percodan, y alka-selzer.
- **TYLENOL y otras marcas que contengan ACETAMINOFEN se pueden seguir usando antes de este procedimiento.**

### Un día antes del procedimiento

- **No coma o tome nada después de la media noche la noche antes de su procedimiento.**

### El día del procedimiento

- **¡ESE DIA NO BEBA NI COMA NADA!**
- Si toma medicamentos, puede tomarlos por la mañana con una pequeña cantidad de agua. Esto quiere decir NO MÁS que unos PEQUEÑOS tragos de agua. **SI** se puede lavar los dientes.
- Llegue al centro de endoscopia **UNA HORA ANTES** de que este programado su procedimiento
- Le conviene dejar sus objetos de valor en su casa (joyería, relojes, etc.) y limite el uso de maquillaje y supeinado.

Por favor, llegue a las \_\_\_\_\_ AM / PM (Please arrive at \_\_\_\_\_ AM/PM)

- Ud. Deberá estar acompañado por un amigo o pariente que lo lleve de regreso a su casa. Ud. **NO PODRÁ** manejar, tomar un taxi o tomar el camión. Su procedimiento se podrá cancelara si no sigue estos requisitos.
- Instrucciones especiales:
- No se administre su dosis de insulina el día del procedimiento. Si cuenta con una válvula de corazón artificial, o ha tenido un historial previo de endocarditis, u otra indicación especifica su doctor podrá prescribir antibióticos antes del procedimiento.
- **Traiga al centro una lista de medicamentos (incluyendo las dosis) y cualquier alergia** que padezca a medicamentos, o condiciones que lo harán sensible a la sedación tal como el caso de síndrome de apnea de sueño.



## Preparación para endoscopia superior (EGD)

Otros \_\_\_\_\_

Después de registrarse, se le colocara una IV en su brazo de manera que podamos administrarle medicamento para adormitarlo y prevenir cualquier molestia durante el procedimiento. Posteriormente, el doctor le colocara el endoscopio en su boca y le pedirá que se lo trague. El endoscopio no interfiere con su respiración y es fácil de pasar por su esófago hasta que llegue a su estómago. Al mismo tiempo que se realiza la endoscopia, pueden realizarse otros procedimientos tales como biopsias o dilatación de áreas angostas. El examen completo no debe de tomar más de 10 a 15 minutos.

**¡Buena suerte! Esta es la parte más difícil del procedimiento.**